

Verzorging na staande castratie

Uw paard heeft een chirurgische ingreep ondergaan. Tijdens de castratie zijn er twee snijwonden gemaakt in het scrotum van uw hengst. Deze wonden worden open gelaten, ze zijn dus niet dicht gehecht. Dit vraagt een aantal dagen extra verzorging van uw paard.

Direct na de castratie:

Uw paard zal nog wat suf zijn van de verdoving die hij voorafgaande aan de castratie gekregen heeft. Laat uw paard niet eten, dus ook geen stro, totdat hij volledig wakker is.

Een staande castratie gebeurt nooit helemaal steriel. Er ontstaat dus altijd een kleine ontsteking in het wondgebied. Om te zorgen dat het ontstekingsvocht uit de wond kan lopen moeten de wonden een aantal dagen open blijven. Beweging in het wondgebied zorgt ervoor dat de wond niet te snel dicht groeit. Het is verstandig uw paard zo veel mogelijk in de wei te laten gedurende de eerste 5 dagen na castratie. Een paddock met zand is minder geschikt omdat er dan vuil in de verse wond kan komen. Indien dit niet mogelijk is, geef uw paard dan minimaal 3 keer per dag wat lichte beweging.

Na afloop van de castratie heeft uw paard een antibioticumsput en een pijnstiller gekregen. Om een infectie in het wondgebied te voorkomen krijgt uw paard een aantal dagen antibiotica. U moet de castratiewond gedurende meerdere dagen na de castratie controleren. Als geen van de hierna te noemen complicaties optreden, zal uw paard snel van de operatie herstellen en na enkele dagen alweer lichte arbeid kunnen verrichten.

Mogelijke complicaties:

- **Zwelling:** het wondgebied zal na de castratie gaan zwellen. Een lichte zwelling van wondgebied en koker is normaal. Indien er echter een sterke zwelling optreedt is het verstandig contact op te nemen met uw dierenarts. Meestal zijn één of beide wonden in het scrotum te vroeg dicht gegaan. Om wondzwelling zoveel mogelijk tegen te gaan kunt u het wondgebied 2 maal daags afsprengen met koud water. Gebruik bij voorkeur een douchekop. Spuit niet recht in de wond!
- **Bloed / wondvocht:** er kunnen druppels bloed of wondvocht uit de wond lopen. Enkele druppels kunnen vaak geen kwaad, deze stoppen vanzelf. Indien er echter een straaltje bloed uit de wond loopt is het verstandig contact op te nemen met uw dierenarts. Er kan dan sprake zijn van een zaadstrengbloeding.
- **Ontsteking in het scrotum:** als er door besmetting met bacteriën een ontsteking in het scrotum ontstaat blijft dat veel te dik en komt er pus uit één of beide wonden. Uw paard kan er ook ziek van zijn. de besmetting met bacteriën kan tijdens de castratie plaatsvinden, maar het kan ook daarna gebeuren zolang de wonden nog niet geheel gesloten zijn.

- Ontsteking van de zaadstrengstomp: dit is een erg vervelende complicatie. Ook nu blijft er pus uit één of beide castratiewonden komen. Vaak zal besloten worden om het paard met antibiotica te behandelen. In een aantal gevallen heeft dat succes, maar het kan ook op een teleurstelling uitlopen. In dat geval is een tweede operatie nodig, waarbij de zaadstrengstomp met al het ontstoken weefsel verwijderd wordt.
- Uittreden van darmen via de wond: dit is de meest gevreesde complicatie. Na een half-bedeekte castratie waarbij de zaadstreng en tunica vaginalis zijn afgebonden is de kan hierop vrijwel nihil. Wanneer het optreedt moet met de grootste spoed de dierenarts gewaarschuwd worden.

Hengst wordt Ruin:

Uw ruin kan nog tot een aantal weken na de castratie vruchtbaar zijn. Zet hem dus niet direct bij merries in de wei. Ook het typische hengstengedrag kan nog een aantal weken tot maanden aanhouden.