

De begeleiding van een fokmerrie

Drs. B.S. van der Heijden

Een goed drachtigheids percentage van uw fokmerries gaat gepaard met een goede veterinaire begeleiding.

Paarden hebben een seizoensgebonden geslachtscyclus, dit betekent dat optimale drachtigheids resultaten te verkrijgen zijn in de periode van ca. maart tot en met augustus. Ondanks goede hengstigheids verschijnselen, komt het vaak voor dat een merrie niet meteen na een dekking of inseminatie drachtig wordt.

Wat kan uw dierenarts doen om een zo goed mogelijk drachtigheids resultaat te krijgen ?


De dierenarts kan door middel van rectaal onderzoek, met behulp van echo apparatuur het meest ideale tijdstip bepalen voor dekking of inseminatie van uw merrie. Dit gebeurt door de grootte van de follikel (het blaasje op de eierstok waarin de eicel zich bevindt), de mate van hardheid van de follikel, de baarmoeder en de baarmoedermond te bepalen



Echobeeld baarmoeder van een hengstige merrie

De dierenarts kan met behulp van echo apparatuur al in een vroeg stadium bij uw merrie een dracht vast stellen (al vanaf dag 14 na inseminatie). Een eventuele tweeling dracht wordt vroeg geconstateerd en deze is mogelijk te reduceren tot een eenling dracht. Soms is bij de vroege drachtigheids diagnostiek al een verminderde kwaliteit van de vrucht vast te stellen.

Daarnaast wordt de merrie tijdens de dracht verder vervolgd om eventueel vroegtijdig aborteren van de vrucht te constateren en om de kwaliteit van de dracht te bewaken.




Corpus luteum (geel lichaam)

Soms lukt het niet om de merrie ondanks inseminatie op het juiste tijdstip drachtig te krijgen. Dan is het belangrijk om de oorzaak daarvan te achterhalen. Een mogelijke oorzaak is een baarmoederontsteking zijn, dan kan het noodzakelijk zijn om de baarmoeder enkele dagen te spoelen met of antibiotica of een verdunde betadine oplossing. Ook baarmoeder cysten kunnen een reden zijn voor het niet drachtig worden van uw merrie; deze zijn onder begeleiding van een video endoscopie te verwijderen.

In een aantal gevallen is het nodig om de hengstigheids cyclus van de merrie te reguleren met behulp van hormoon therapie. B.v. het zogenaamde δ hengstig δ spuiten of het toedienen van drachtigheids hormoon.

Sommige merries hebben door slapte of te zwaar veulenen een onvolledig sluitende vulva. Dit kan het zo genoemde δ luchtzuigen δ veroorzaken. Een kleine operatie is dan



30 dagen dracht

noodzakelijk om een goede sluiting van de vulva te herstellen. Sommige merries laten na het urineren urine oterugö richting baarmoeder lopen. Bij deze merrie's staat dan constant urine voor de baarmoedermond. Ook dit is middels een kleine operatie te herstellen.



Indien u de merrie wilt insemineren met diepvries sperma is het van nog groter belang om op het juiste tijdstip te insemineren. Kliniek opname van de merrie is dan vaak erg praktisch voor zowel eigenaar als dierenarts.

Bij inseminatie met sperma van mindere kwaliteit of bij zeer kostbaar sperma is het vaak zinvol, om zowel kosten als sperma te besparen door de merrie niet in het baarmoederlichaam maar in het puntje van de baarmoeder hoorn te insemineren. Bij inseminatie op de kliniek wordt zowel diepvries als vers/gekoeld sperma door uw dierenarts op kwaliteit gecontroleerd.

Het gebit van de merrie

Het is verstandig om voordat u een merrie laat insemineren het gebit van de merrie te laten controleren. Indien noodzakelijk kan de behandeling plaats vinden voordat de merrie drachtig is. Hiermee is de voedsel opname tijdens de dracht beter en efficiënter.

Ziektepreventie

Indien gewenst kunt in overleg met de dierenarts een vaccinatie schema opstellen voor de drachtigheidsperiode zodat merrie en veulen optimaal beschermd zijn tegen virusziekten.

